

A photograph of two women from behind, embracing each other. The woman on the left has short blonde hair and is wearing a light pink blouse. The woman on the right has long brown hair and is wearing a dark top with several bracelets on her left wrist. They are outdoors with a bright, blurred background.

VOTRE GUIDE SUR PrTAVNEOS^{MD}

 PrTAVNEOS^{MD}
(avacopan)

 orijin^{MC}
PROGRAMME
DE SOUTIEN

LE PRÉSENT GUIDE EST DESTINÉ AUX PERSONNES À QUI L'ON A PRESCRIT ^{Pr}TAVNEOS^{MD}

Renseignez-vous sur la vascularite à autoanticorps anticytoplasme des neutrophiles (ANCA) active et grave (également appelée VAA).

La Fondation vasculites Canada est un organisme bénévole qui offre de l'information et des ressources aux personnes atteintes de VAA comme la granulomatose avec polyangéite (GPA) ou la polyangéite microscopique (PAM).

Pour en savoir plus sur la Fondation vasculites Canada, numérisez le code QR ou visitez le **vasculitis.ca**.



Otsuka Canada Pharmaceutique n'exploite pas ces sites externes et n'est pas responsable de leur contenu. Si vous avez des questions ou des préoccupations sur les produits, les services ou le contenu de ces sites, veuillez communiquer directement avec les tiers qui les exploitent.

AU SUJET DE PrTAVNEOS^{MD}



POURQUOI TAVNEOS EST-IL UTILISÉ?

PrTAVNEOS^{MD} est employé pour traiter les adultes atteints de maladies appelées **vascularites à autoanticorps anticytoplasme des neutrophiles (ANCA)** actives et graves.

Ces maladies comprennent :

- la granulomatose avec polyangéite (GPA)
- la polyangéite microscopique (PAM)

TAVNEOS est utilisé en même temps que d'autres médicaments pour traiter ces maladies.



MODE D'ACTION DE TAVNEOS

TAVNEOS se lie à un récepteur dans le corps et bloque l'inflammation. Cet effet peut être perçu en quelques heures. Vos symptômes pourraient s'atténuer dans les 4 premières semaines de votre traitement.



CONSERVATION DE TAVNEOS

Conservez TAVNEOS à la température ambiante (de **15 à 30 °C** ou de **59 à 86 °F**) et dans l'emballage d'origine. Gardez-le hors de la portée et de la vue des enfants.

PRISE DE Pr TAVNEOS^{MD}

COMMENT PRENDRE TAVNEOS

Prenez 3 gélules le matin avec de la nourriture et 3 gélules le soir avec de la nourriture, selon les directives de votre professionnel de la santé.

Le fait de suivre une routine pourrait vous aider :



3 gélules
au déjeuner



3 gélules
au souper

Si vous pensez avoir pris trop de TAVNEOS, contactez immédiatement un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou votre centre antipoison régional, même en l'absence de symptômes.





IL EST TRÈS IMPORTANT DE SUIVRE LES CONSIGNES SUIVANTES :

- Prenez ^{Pi}TAVNEOS^{MD} exactement comme votre professionnel de la santé vous dit de le faire.
- Avalez les gélules entières avec de l'eau.
- Vous ne devez pas écraser, mâcher, ni ouvrir les gélules.
- Évitez le pamplemousse et le jus de pamplemousse.
- Informez votre professionnel de la santé de tous les médicaments que vous prenez, y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les produits de médecine douce.
- Discutez avec votre professionnel de la santé à propos d'une réduction de votre consommation d'alcool.

SI VOUS OUBLIEZ UNE DOSE DE TAVNEOS

- Si vous oubliez une dose et qu'il reste plus de 3 heures avant votre prochaine dose, prenez la dose omise dès que vous y pensez.
- S'il reste moins de 3 heures avant votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et prenez la dose suivante au moment prévu.
- Ne doublez pas la dose pour compenser votre oubli.

**Suivez toujours les directives de votre professionnel de la santé.
En cas de doute, consultez votre médecin.**

EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES



maux de tête
grippe, rhume
feu sauvage



hypertension
(« haute pression »)
fatigue



nausées
vomissements
diarrhée
maux de ventre
gastroentérite
(grippe intestinale)



éruption
cutanée

Voici certains des effets secondaires possibles que vous pourriez ressentir lorsque vous prenez ^{PI}TAVNEOS^{MD}.
Si vous présentez un effet secondaire qui ne figure pas dans cette liste ou qui devient si problématique qu'il interfère avec vos activités quotidiennes, consultez votre professionnel de la santé.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AU SUJET DE VOTRE TRAITEMENT PAR ^{Pr}TAVNEOS^{MD}

AVANT DE PRENDRE TAVNEOS

Communiquez avec votre professionnel de la santé si vous :

- avez des problèmes de foie;
- souffrez d'une infection par le virus de l'hépatite B (VHB);
- êtes enceinte, croyez l'être ou prévoyez le devenir. On ignore si TAVNEOS pourrait être nocif pour un bébé à naître;
- allaitez ou avez l'intention de le faire. On ignore si TAVNEOS peut passer dans le lait maternel et nuire au bébé. Discutez avec votre professionnel de la santé de la meilleure manière de nourrir votre bébé si vous prenez TAVNEOS;
- avez une ou plusieurs infections qui reviennent souvent;
- avez des problèmes de cœur;
- prévoyez recevoir un vaccin. Il est recommandé de recevoir vos vaccins avant de commencer un traitement par TAVNEOS;
- prenez du cyclophosphamide et de l'azathioprine.

EFFETS SECONDAIRES GRAVES ET MESURES À PRENDRE

**COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ
DANS TOUS LES CAS SI VOUS PRÉSENTEZ L'UN DES EFFETS SUIVANTS :**

- Hausse des taux sanguins d'une enzyme (créatine phosphokinase)
- Infection des voies respiratoires, de la bouche, de la peau ou de l'oreille
- Problèmes de foie
- Pneumonie (infection des poumons)
- Infection des voies urinaires
- Diminution du nombre de globules blancs
- Réactivation du virus de l'hépatite B

**COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ
SI VOUS PRÉSENTEZ L'EFFET SECONDAIRE SUIVANT,
MAIS SEULEMENT SI L'EFFET EST GRAVE :**

- Nausées





**ARRÊTEZ DE PRENDRE PrTAVNEOS^{MD}
ET OBTENEZ UNE ASSISTANCE MÉDICALE
IMMÉDIATE SI VOUS PRÉSENTEZ L'UN
DES EFFETS SUIVANTS :**

Réaction allergique :

difficulté à avaler ou à respirer; respiration sifflante;
enflure du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge.

Angioœdème (enflure grave sous la peau) :

enflure du visage, de la gorge, des bras, des jambes ou
des parties génitales; éruption cutanée ou urticaire;
douleur et sensation de chaleur dans les régions atteintes,
sensation de serrement dans la gorge, difficulté à respirer,
difficulté à avaler, douleur abdominale, vomissements,
étourdissements, douleur dans la poitrine.



OBTENEZ DE L'AIDE GRÂCE AU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PATIENTS ORIJIN^{MD}

Destiné aux patients traités par ^{Pr}TAVNEOS^{MD}, le programme de soutien aux patients ORIJIN offre de nombreux services, dont :

- Aide dans les démarches de remboursement
- Quote-part pour les patients qui ont accès au remboursement
- Soutien lors de la transition du milieu hospitalier à la communauté

Pour en savoir davantage sur le Programme de soutien aux patients ORIJIN, composez le 1 844 254-6272 ou visitez le site orijinsupport.ca.



Toutes les marques de commerce suivies des mentions ^{MD} ou ^{MC} sont protégées (déposées ou non) par leurs propriétaires ou concédants de licence. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.otsukacanadatm-mc.ca.

© Otsuka Canada Pharmaceutique. Tous droits réservés.
OCPI-TAV-00017F

